



URGENT : MESURES IMMÉDIATES NÉCESSAIRES

À : **TOUS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS**
De : **Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang***
Objet : **AVIS DE PHASE DE RETOUR À LA NORMALE**

Avis sur l'état des réserves nationales

Date et heure d'émission	2022-06-03, 0600 (HNE)
Phase	PHASE DE RETOUR À LA NORMALE
Produit(s)	Concentrés de globules rouges (CGR) O- et B-
Description	<p>La présente est pour vous informer que la phase verte déclarée le 3 mai 2022 pour les globules rouges O- et B- est passé à une phase de retour à la normale.</p> <p>Les niveaux de stocks, bien qu'encore inférieurs aux valeurs optimales, se sont quelque peu améliorés et la croissance continue laisse prévoir un retour à la normale. Ces niveaux demeurent toutefois précaires, car la Société canadienne du sang continue d'observer une baisse des collectes en raison des annulations de rendez-vous et des rendez-vous manqués. De plus, on craint une augmentation de la demande lors du long week-end de juillet. Il est donc impératif que tous les intervenants du système du sang continuent de gérer les stocks avec prudence et ne dépassent pas leurs niveaux de stocks prédéfinis pour la phase verte.</p> <p>Les stocks de la Société canadienne du sang et des établissements dont les données sont transparentes continuent d'être surveillés, mais les hôpitaux n'ont plus à soumettre leurs niveaux de stocks tous les jours. Si la situation s'aggrave, si un nouveau risque est identifié à l'échelle nationale ou si la demande des hôpitaux dépasse les prévisions et entraîne des répercussions sur les projections, il pourrait s'avérer nécessaire de retourner à la phase verte.</p> <p>Le CNUGRS continuera de se réunir et d'émettre des avis chaque semaine pendant au moins les quatre prochaines semaines.</p>
Conséquences pour les hôpitaux	<p><u>Mesure requise</u></p> <p>Nous demandons aux hôpitaux de continuer à gérer leurs stocks avec prudence et de ne pas dépasser leurs niveaux de stocks prédéfinis pour la phase verte.</p> <p>Nous recommandons aux hôpitaux de veiller à l'utilisation appropriée des produits sanguins. Les recommandations qui ont déjà été diffusées et qui devraient continuer à être renforcées sont les suivantes :</p> <p>CGR O- Appliquez les pratiques exemplaires élaborées par le Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins : Gestion et utilisation des réserves de culots globulaires du</p>

	<p>groupe O RhD négatif.</p> <p>Tous les CGR de rhésus négatif Le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang recommande d'appliquer les pratiques exemplaires suivantes pour tous les CGR de rhésus négatif, ce qui est particulièrement important pour les CGR du groupe B- en raison du faible niveau de ces réserves.</p> <p>Recommandations pour une utilisation appropriée des CGR de rhésus négatif, TOUS GROUPES CONFONDUS</p> <table border="1" data-bbox="375 464 1585 1150"> <tr> <td data-bbox="375 464 1585 512">Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 512 1585 611"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 611 1585 659">Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 659 1585 743"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 743 1585 869">Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 869 1585 953"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 953 1585 1037">Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1037 1585 1150"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) </td> </tr> </table>	Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 	Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 	Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang 	Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités)
Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 									
Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 									
Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang 									
Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) 									
Complément d'information	<p>Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'agent de liaison de la Société canadienne du sang; 2. votre représentant au Comité provincial/territorial d'urgence pour la gestion du sang; 3. votre représentant au comité hospitalier d'urgence pour la gestion du sang. 								

* Le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang est constitué de représentants du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins, du Comité de liaison provincial-territorial et de membres du personnel de la Société canadienne du sang. Il formule des recommandations et conseille les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les autorités régionales de la santé, de même que la Société canadienne du sang, pour favoriser une réponse uniforme et coordonnée en cas de grave pénurie de sang au Canada.

Pour en savoir plus sur le Plan national de gestion en cas de pénuries de composants sanguins labiles, consultez le site suivant : [Blood Shortage | National Advisory Committee on Blood and Blood Products \(NAC\) \(nacblood.ca\)](http://BloodShortage|NationalAdvisoryCommitteeonBloodandBloodProducts(NAC)(nacblood.ca)). Si vous souhaitez obtenir le présent avis dans un format accessible, communiquez avec l'agent de liaison avec les hôpitaux de la Société canadienne du sang de votre région.